

難
峯
普
濟
方

雞峯普濟方卷第十九

馮翊賈兼重校定

消渴

水

熟乾地黄元

治癰腎煩渴小便數多脚弱陰萎唇乾眼澁

身躄乏力

熟乾地黄

貳兩

五味子

澤瀉

遠志

牛膝

玄參

車前子

桑螵蛸

山茱萸

桂心

人參

附子

各半兩

黃耆

枸杞子

肉蓯蓉

薯蓣

牡丹

白茯苓

甘草

各參分

麥門冬

壹兩半

兔絲子

白石英

各壹兩

右爲細末入石英研令勻煉蜜和杵三五百下元梧桐

子大每於食前以溫酒下三十元

黃耆元治大渴後上焦煩熱不退下元虛乏羸瘦無力小便白濁飲食微少

黃耆

肉蓯蓉

鹿茸

各壹兩

人參

參分

枸杞子

貳分

熟乾地黄

貳兩

白茯苓

參分

甘草

各半兩

地骨皮

半兩

澤瀉

附子

巴戟

禹餘糧

桂

牡丹皮

五味子

龍骨

各參分

磁石

壹兩

赤石脂

參分

麥門冬

半兩

牡蠣

參分

右為細末入研了藥令勻煉蜜和杵五七百下元梧桐

子大每服食前米飲下三十元

蓯蓉元

治疳腎小便滑數四肢羸瘦脚膝乏力

肉蓯蓉

壹兩

熟乾地黄

壹兩半

麥門冬

貳兩

澤瀉

五味子

各半兩

磁石

黃耆

人參

各壹兩

桂

半兩

巴戟

半兩

地骨皮

分叁

當歸

半兩

鷄臍胫

壹兩

赤石脂

半兩

韭子

半兩

白龍骨

半兩

甘草

半兩

禹餘糧

分叁

牡丹皮

兩半

桑螵蛸

壹兩半

右為細末入研了藥令勻煉蜜和杵三五百下元梧桐子大每服食前清粥飲下三十元

山茱萸元

治三消飲食倍多肌腠羸瘦小便頻數口乾喜

飲

山茱萸

鹿茸

附子

炮

五味子

菰蓉

巴戟

澤瀉

禹餘糧

牡丹皮

各壹兩半

磁石

麥門冬

赤石脂

白龍骨

各叁兩

枯樓

熟乾地黄

韭子

各貳兩半桂心壹兩壹分

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服二十元空心酒下日再服

腎瀝湯治疝腎氣虛損發渴小便數腰膝痛

鷄臍脰

遠志

人參

黃耆

澤瀉

桑螵蛸

熟乾地黄

桂

當歸

龍骨

各壹兩

甘草

半兩

麥門冬

貳兩

五味子

半兩

磁石

叁兩

白茯苓

壹兩

芎藭

貳兩

玄參

半兩

右爲末每服用羊腎一對切去脂膜先以水一大盞半煮腎至一盞去水上浮膜及腎次入藥三錢生薑半分煎至五分去滓空心溫服晚食前再服

花從蓉元

古今錄驗論消渴病有三一渴而飲水多小便數其脂似麩片甜者此是消渴病二喫食多不甚渴小便少似有油而數者此是消中病也三渴水不多但腿腫脚先瘦小陰萎弱數小便者此是腎消病也特忌房勞若消渴者倍黃連消中者倍苁蓯腎消者加芒消六分服前件鈔丹元得小便鹹苦如常後恐虛憊者並宜服此

花從蓉

分捌

澤瀉

五味子

紫巴戟天

地骨白皮

栝蓯

分各肆

磁石

人參

赤石脂

分各陸

乾薑

分拾

禹餘糧

分叁

桑螵蛸

分叁拾

右為細末煉蜜和元梧桐子大以牛乳空腹下二十元

日再服忌海藻松葉胡荽蕪荑等

黃連黃耆元 治疳腎小便白濁四肢羸瘦漸至困乏

黃耆 黃連 熟乾地黄 牡礪

鹿茸各壹兩 白茯苓 土苴根 玄參 地骨皮

龍骨 人參 桑螵蛸 五味子各叁分

交門冬貳兩 菝葜兩半

右為細末煉蜜和杵五七百下元梧桐子大每服三十

元食前米飲下

雞內金散 治消渴

朱砂 黃連 鐵粉 括婁各叁兩 赤石脂

蘆薈 龍骨各貳兩 鈆丹 胡粉各壹兩 甘草

澤瀉

各壹兩半

牡礪

叁分

螬蛸

叁拾个

雞胚胫

柒个

右為細末空心大麥湯調下三錢匕小便減渴止食後服

薯預元

治瘠腎小便滑數四肢少力羸瘦困乏全不思食

薯預

雞胚胫

熟地黄

牡丹皮

黃耆

苁蓼根

白龍骨

白茯苓

山茱萸

桂

澤瀉

附子

枸杞子

各半兩

麥門冬

貳兩

右為末煉蜜和杵三五百下元梧桐子大每服食前以清

粥飲下三十元

茱萸黃耆元

治瘠腎心神虛煩小便無度四肢羸瘦不思

飲食唇舌乾燥脚膝乏力

黃耆

山茱萸

人參

五味子

各冬分

熟乾地黄

鷄胚脰

肉苁蓉

牛膝

補骨脂

鹿茸

各壹兩

麥門冬

貳兩

地骨皮

白茯苓

玄參

各半兩

右爲細末煉蜜和杵三五百下元梧桐子大每於食前以粥飲下三十元

人參瀝湯

治大虛不足小便數噓吸焦渴引飲膀胱滿

人參

石斛

麥門冬

澤瀉

熟地黄

括蕞根

地骨

各兩

遠志

甘草

當歸

五味子

桑白皮

桂心

茯苓

各半兩

右爲鹿末以水一盞半煮羊腎一箇至一盞入藥二錢

仍先去腎煎至六分去滓溫服不以時

增損腎瀝湯 治腎氣不足消渴小便數腰痛乏力消瘦

遠志 人參 澤瀉 熟地黄

當歸 各參分 桂 茯苓 黃芩

甘草 芎藭 龍骨 各壹分 五味子 貳分

交門冬 貳分

右為鹿末以水一盞半煮羊腎一箇至一盞去腎入藥
二錢煎至六分去滓溫服日三兼服後方

熟地黄散 治脬腎小便滑數口乾心煩皮膚皴乾燥腿膝消
細漸至無力

熟乾地黄 鷄胚脰 黃耆 白茯苓

牡礪粉

人參

牛膝

各壹兩

麥門冬

桑螵蛸

枸杞子

各參分

龍骨

壹兩半

右為細末每服三錢以水一中盞煎至六分去滓非時溫服

白茯苓元

治疝腎因疝中之後胃熱入腎消燂腎脂令腎

枯燥遂致此病即兩腿漸細腰脚無力

白茯苓

覆盆子

黃連

人參

苾蓐根

熟乾地黄

萆薢

玄參

各壹兩

雞胚胚

各參分

石斛

地床子

各參分

右為細末煉蜜和杵三百下元梧桐子大每於食前煎磁石湯下三十元

千金古瓦湯

治消渴虛乏食少無力小便頻數

白木御

熟乾地黄切

切

陳皮

人參

甘草

黃芩

遠志

各參分

當歸

桂

白芍藥

各參分

右為鹿末每服四錢先以水三大椀煮屋上瓦二兩

拾貳

年以上者打碎如皂子大

煮至一椀半去瓦塊入藥末并生薑干片

棗一箇再煎至二大盞去滓放溫服渴時飲之多喫下

黃耆散

治消腎心神煩悶小便白濁

黃耆

麥門冬

茯苓

龍骨

苳蓂根

熟乾地黄

桑螵蛸

白石脂

澤瀉

各壹兩

甘草

參分

右為細末每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三箇煎至六分去滓空心溫服

鐵粉湯 治消渴不止心神煩亂宜服此湯

鐵粉壹兩

麥門冬貳兩 牡蠣

知母各壹兩

黃連

苦參

苡薏根各貳兩

金薄壹百片 銀薄貳百片

右為細末鐵粉同研令勻不以時候清粥飲調下一錢

金箔鈇丹元 治消渴不止

金薄壹百片

銀薄貳百片 鈇丹

麥門冬 牡蠣

知母各壹兩

黃連

括薏根

苦參各貳兩

右為末用括薏汁和准夏季即用煉蜜和元梧桐子大每服四十元食後以米飲下日進二服當日必見効可

服及十日每三五十元後每日只進一服服藥次勿覺
腹痛以厚朴六錢陳皮一分生薑六錢都剉碎用水二
升煎至半升溫服訖良久用水飯壓之腹不冷痛不用
此法

腎氣丸治腎不足羸瘦目劇吸吸少氣膝重耳聾小便頻
濁渴欲飲水腰脚无力行履艱難

熟地黃

兩捌

山藥

山茱萸

各肆兩

牡丹

澤瀉

茯苓

各叁兩

附子

桂心

各貳兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服三十元空心酒下

鈔丹散止消渴主小便數兼治消中

鈔丹

胡粉

各叁分

括萎根

甘草

各捌分

澤瀉

石膏

白石脂

赤石脂

各參分

右八味治下篩水服方寸匕日三服一年病者一日愈二年病者二日愈瀉甚者夜二服腹痛者或作元服亦佳一服十元傷多令人腹痛

兔絲子散治瘡腎小便白濁或不禁

兔絲子

黃連

肉蓯蓉

五味子

各壹兩

蒲黃

雞胚胫中黃皮

各壹兩半

磁石

半兩

右為細末入研藥令勻每服二錢食前粥飲調下

人參鹿茸元

治瘡腎小便滑數白濁將欲沉困

鹿茸

肉蓯蓉

各壹兩半

黃芩

人參

土茯苓

各參分

雞胚胫

拾個

兔絲子

兩參

右為細末煉蜜和杵三百下元梧子大每服三十元
食前米飲下

薯蕷湯止渴退熱男子消渴小便極多水飲一斗小便一
斗腎氣丹主之既服前腎氣丹補其虛損食後宜此藥

黃耆 茯神 苁蓉根 人參

甘草各壹兩半 麥門冬 熟地黄各壹兩半

右水煎服之此病切忌慎者三一飲酒二行房三鹹食
及麵食

菝葜湯治腎虛小便數而渴并歌清瘦形容又牀虛相逢
惟是舌乾枯上焦客熱下元冷涼藥如何解去除請公採
取菝葜服溫脾補腎藥中殊一一志心依此服上下和平

渴自無

菰蔞

壹兩劉如豆大

右用水二盞半煎至八分去滓溫服旦中暮各一服竟減則日二服後以藥調補此方在腎瀝湯方前

斷渴湯

治消渴不止

烏梅肉

兩

麥門冬

人參

甘草

茯苓

乾葛

各壹兩

右為細末每服三錢以水一盞半煎至六分去滓溫服

加減六物元

治熱中消渴

括萎根

兩

麥門冬

壹兩半

知母

壹兩分

人參

苦參粉

土瓜根

各壹兩

右爲細末以牛膽汁和元梧桐子大每服二十元日三服大麥粥汁下未知漸加至三十元咽乾者加麥門冬舌乾加知母脇下滿加人參小便難加苦參小便數加土瓜根

阿膠湯治虛熱小便利而多服石散人小腸虛熱當風取冷患脚氣喜發動兼渴消腎脉細弱微宜此湯

阿膠

兩半

乾薑

拾

麻子仁

遠志

各壹兩半

附子

壹

右爲麤末每服二錢以水一盞煎至六分去滓溫服不以時

茯苓黃連元渴人引飲既久夏秋之交濕氣過多脾胃又

弱時或洩瀉

黃連末

分捌

茯苓

分陸

木香

貳分

訶子皮

壹分

右為細末水煮麵糊為元梧桐子大每服三十元空心瀉止勿服

葛根飲子止渴

葛根

麥門冬

竹茹

菰莢

各半兩

右為鹿末水煎或熬粥食之亦佳

乾葛散治消渴

仙人骨

去花結子了
蘿蔔乾者是

仙人蓑衣

出了蓮子
乾蓮蓬

乾葛

銀湯餅內餡

右四味等分為細末每服二錢紫蘇熟水下

枸杞湯 治虛勞口中苦渴骨節煩熱或寒

枸杞根升伍

麥門冬升叁

小麥升貳

右三味以水二斗煮麥熟藥成去滓每服一升日再服

消餘元 治消渴小便不禁

退鉗鍋壹个

牡礪不以多少末

右以牡礪實在鉗鍋內大火煨通赤放冷各搗研爲細末每秤一兩更入乾葛一兩研勻以雞子清和元梧桐子大每服二十元猪肉湯下

嬰粟湯 治消渴引飲不止

嬰粟不以多少

右研煮稀粥日飲一盞

兔絲子元治渴

兔絲子

揀擇水淘浸三日控令乾乘潤杵篩麋末再焙

右爲細末煉蜜合麵糊爲元梧桐子大每服米飲下三十元

黃連元治渴

黃連

不以多少

右內猪肚中飯上蒸爛同杵元梧桐子大每服米飲下三十元

治渴不止方

右冷水浸桑椹食之甚奇

神効黑神元治三焦渴疾

好𧄸丹

壹兩用絹裹扎定甑中以蓋蔓之蒸升炊了取出於地下用碗覆蓋少時尽熱毒氣為度

右用好京墨研濃如稀糊搜和為元如梧桐子大如少壯人每服五七元年老三兩元漸加元數服之不渴更不得再服然後服補藥大忌房色及炙燂之物

黃連煎

治酒毒水毒渴不止

黃連末

以新括蔓根汁和作餅子焙乾

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服三四十元熟水下不以時

熟乾地黄元

療五勞七傷六極八風十二痺消渴心下積

聚常服身躰潤澤補養精血

熟乾地黄

拾貳分

天門冬

拾分乾薑陸分

兔絲子

拾分

石斛

分捌

當歸

白朮

白芍藥

牛膝

紫苑

防風

地骨皮

各陸分

甘草

捌分

肉苁蓉

麥門冬

玄參

各柒分

人參

茯苓

杏仁

麻子仁

各捌分

椒目

叁分

右為細末煉蜜和元梧桐子大空心酒下二十元再服

漸加至三十元忌鯉魚海藻菰菜桃李雀肉魚鯽蕪荑

濡咽煎治渴口舌燥澀

甘草

兩叁

酥

蜜

各壹升

右內蜜中煎如薄膏含嚥之

生地黄元

治消渴面黃咽燥短氣除虛熱補養

地黃汁

桔萎汁

各叁升半

牛脂

叁升

白蜜

半升

黃連末斤壹

右同煎可元即元梧桐子大每服五元不以時米飲下
茱萸元若其人素渴引飲一旦不渴小便日夜數十行氣
之內消謂之消中

菰蓉 五味子 山茱萸 乾山藥

右等分爲細末酒煮麵糊爲元梧桐子大米飲下三十
元空心

治水

附子木香元治水氣下後補藥消積進食凡水氣已經利
下疾證往來不定

附子 木香 石斛 桂

黃耆

磁石

椒目

茂

當歸

鹿茸

人參

茯苓

枳殼

訶子

黃橘皮

桃人

白朮

桑白皮

桔梗

牛膝

乾薑

厚朴

吳茱萸

各半兩

右爲細末以猪腎三對生研入酒三合饌餅少許同杵和元梧桐子大每服二十元空心食前溫米飲下

治水氣法

此病緣脾氣衰弱土不能制水致水妄行始則脛腫漸次腹腫流溢皮膚遍身浮腫百藥不効可服此玉龍元先叙證候次具始末一宗元散若別遇明醫治之減退

更不須此藥或疾勢未瘳不可輕聽庸醫妄進藥餌恐傷臟腑及損動血氣愈難將息

辯水證

項脛脉動睡起眼浮下如蚕卧足脛腫股間冷身重倦行行即喘急面有時而白及光潤準頭黑腸門瀝瀝如水鳴鼻尖常冷小便赤澁雖頻數絕微細大便燥結卧即哽氣或喉中如水雞聲腹脇滿悶咳嗽不止凡此皆水證也不可盡紀此病不宜動大腸峻瀉醫者多用羌花大戟甘遂葶藶猪苓澤瀉之類故消取雖易補閉即難往往致水復來而无以治之也今茲紀方各有次序有補有瀉全不損氣能除病根若疾勢未甚不可遽服

須是證候十分臨證可數服之見効愈捷

紫金丹治水

丁香半斤

木香壹錢

檳榔

肉豆蔻各壹斤

白丁香半斤

朱砂壹斤

雄黃壹斤

輕粉壹錢

粉霜半斤

桂府滑石壹斤

水銀壹斤

赤土叁斤

班猫拾个

巴豆叁拾个

乳香壹斤

桃仁叁拾个

廣礮此藥不見用疑傳寫之誤

牛黃各壹字

麝香壹斤

鵬砂壹字

右二十味為細末水煮麵糊為元如菉豆大每服十元至十五元量虛實加減蓋欲行水須先去滯積未服玉龍元當先進此藥如不動再加元數服之候取動可服

玉龍元方在後

蛇黃紫金丹

治水氣汨支飲上氣欲變成水心下堅硬者

蛇黃

研令无声

禹餘糧

炒醋淬

木香

肉豆蔻

乾薑

茯苓

當歸

羌活

牛膝

青橘皮

芎

荆三稜

陳橘皮

葵梨子

桂

附子

蓬莪朮

茴香

針沙

五兩先水淘極淨以鐵銚子炒乾入米醋貳升煮醋令乾就銚中煨通赤

研末令極細用之或參兩

右為細末饅餅和元梧桐子大每服三十粒空心食前米飲下

千斧元

治水氣補藥兼治男子婦人五勞七傷病勢甚者

柳絮繼砮片半雷元壹兩

柴胡貳兩

樟柳根壹兩

木瓜焙乾切乾漆各半兩

白礬貳兩

膽礬

芫花

檳榔

茴香

石斛

定粉

不艸皂角

桂各半兩

青皮貳兩

右為細末用青州棗煮熟去皮核將藥末用醋五升熬成膏後入棗同勻用太斧槌一千下逐旋元如菉豆大每服十元食後生薑湯下日三服

三部茯苓煎

治三焦上中下焦令為三部三焦道閉塞不

通留水在膈上不消化名痰水積年不去雖服藥下之不能便去雖得小去隨復如故其病面目黧黑手足逆冷身

躰枯燥肌膚甲錯身無潤澤漸斬羸瘦或時嘔吐或大便秘或後重下痢起止甚難久或絞痛雷鳴時時下痢

茯苓

分

大黃

咸槓代

白朮

各壹兩半

桔梗

芎

熟地黃

神麴

前胡

各兩半

乾薑

桂

各壹兩

黃芩

或半夏代

人參

白芍藥

菖蒲

各叁分

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服十元米飲下非時

椒人元

若腹脹如鼓按之堅硬腹中時痛始起於目下微

腫時喘

小便不利四肢瘦削其脉自沉大便利則逆謂之

石水繞臍堅硬腹不痛者謂之鼓氣石水宜椒人元鼓氣

宜木香元方在後

椒人

五靈脂

吳茱萸

甘遂

玄胡索

續遂子

郁李仁

黑牽牛子

附子

木香

各半兩

芫花

石膏

各壹分

信砒

壹

右為細末水煮麵糊和元如菰豆大橘皮湯下一元空心臨卧未知加一元復未知日午再服一服

水腫茯苓煎

治肢飲上氣黃疸及脚氣消渴後成石水腹

脇堅脹足脛浮腫上氣不得卧口乾頸脉動腹脹間冷大小便不利

茯苓

白朮

椒目

各肆分

防已

葶藶

澤瀉

各伍分

赤小豆

前胡

芫花

桂各參分

芒消參分

甘遂參分

右爲細末煉蜜和元梧桐子大每服五粒日一服漸加之以小便利爲度

十水丹 治水

青水先從面目腫大戟主之

赤水先從心腫葶藶主之

黃水先從腹腫甘遂主之

白水先從脚腫上氣而咳葶藶本主之

玄水先從面腫至足腫芫花主之

黑水先從跌腫連翹主之

風水先從四肢起滿大身盡腫澤瀉主之

石水先從四肢小腹腫滿大桑白皮主之

累水先從小腸滿巴豆主之

氣水乍盛乍虛乍來乍去赤小豆主之

右十味藥皆等分與病狀同者則倍之白蜜和元先食服一粒如小豆大日三服欲下病者服三粒乃量虛實增減之

七百五十元 方行水補虛

葫蘆巴 破故紙 丁香 華澄茄

大椒 各壹拾伍个 芭豆 烏梅 各貳拾伍个 木香 半斤

右一處為細末水煮麵糊為元如黍米大每服五元食後茶湯下量虛實加減服此藥大和氣進飲食消滯積

白元子治水氣

龍腦

粉霜

各壹分

輕粉

三兩以上同研勻用白麵壹匕同和作一毬子慢

火中燒黃研如粉

海蛤

貳分紅研末

寒水石

壹分

滑石

貳分

海金沙

壹分

陽起石

壹分

右研勻細糯米飯爛研元如豌豆大每服十元生薑湯下不以時日三服五日後牙縫中血出及臭涎即住服如涎血未出加十元又五日未下更加十元直以涎出出即住藥未即每五日更加元數腫消則尤要將息慎椒目煎治大腹水腫氣息不通睡卧不得上喘氣急

椒目

黃牽牛

桂

各半

昆布

海藻

甜葶藶

各叁分

牛黃

人參

各壹分

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服十元米飲下不以時日二服加至二十元以小便利為度

滑石元利小便治水氣

木通

滑石

各參兩半

瞿麥

壹兩半

海金沙

陸參半

甘遂

陸參

通草

肆參

水蛭

壹參

地膽

拾個

右為細末糯米粥和元梧桐子大臨卧煎燈草滑石湯下七元

千金翼澤漆湯

主水通身洪腫四肢無堪或從消渴或從

黃疸支飲內虛不足榮衛不通血氣不行喘息不安腹中響脹滿眼不得視方

澤漆根

拾兩

赤小豆

貳升

甘草

貳兩

鯉魚

壹頭約伍斤去腸胃

麥門冬

茯苓

人參

各二兩

生薑

兩

右八味切以水一斗七升先煮鯉魚小豆減七升去之內藥者取四升半去滓服三合日三服人二合再服氣下喘止可至四合晬時小便利腫氣減或小溲下若便大利還從一合始大便止若無鯉魚同音亦可用水甚不得卧卧不得轉側加澤漆一片渴加葶藶二兩欬加紫苑二兩細辛一兩欬冬花一兩桂三兩增魚汁忌海藻菰菜鮓物等

解帶散治水腫腹脹如鼓上氣喘急前後心刺痞小便利

海帶

海藻

昆布

益智

木香

雷元

蘿蔔子

皂皂黃

論說

右等分爲細末每服二錢酒一盞煎之服後須分泄百次不

病源曰腎者主水脾胃主土土性尅水脾与胃合相爲表裏胃爲水穀之海今胃虛不能傳化水氣使水滲液經絡浸漬臟腑脾得水濕之氣則病脾土不能制水故水氣獨歸於腎三焦不瀉經脉閉塞故水氣溢於皮膚而令腫也其狀目裹上微腫如卧起之狀頸脉動時咳股間冷以手按腫處隨手而起如物裹水之狀口苦舌麁不得正偃偃則欬清水不得卧卧則驚欬甚小便黃色是也水病有五不可療第一唇黑傷肝第二缺盆平傷心第三臍凸傷脾第四足下平滿傷腎第五背平傷肺凡此五傷必不可療

脉沉者水也脉洪大者可治微細者不療也養生方云十一月勿食自死肉脯動於腎喜成水病黃帝問曰水與皮膚脹鼓脹腸覃石瘕何以別之歧伯對曰水始起也目裹上微腫如蚕卧起之狀頸脉動時欬陰股間寒足胫腫腹乃大其水已成發手按其腹隨手而起如裹水之狀此其候也膚脹者寒氣客於皮膚之間殼殼然不堅腹大身盡腫皮厚按其腹陷而不起腹色不變此其候也鼓脹者腹脹身腫大與膚脹等其色蒼黃腹脉起此其候也腸覃者寒氣客於腸外與胃氣相搏正氣不得營因有所繫瘕而內著惡氣乃起息肉乃生其始也大如雞卵稍以益大至其成也若懷子之狀久者離歲月按之則堅推之則移月

事不以時下此其候也石瘕者生於胞中寒氣客於子門
子門閉塞氣不得通惡血當瀉不瀉衄以留止日以益大
狀如懷子月事不以時下皆生於女子可導而下之曰膺
脹鼓脹可刺耶對曰先瀉其腹之血絡後調其經亦刺去
其血脉師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風
水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脉亦浮外
證肘腫按之没指不惡風其腹如鼓不滿不渴當發其汗
正水其脉沉遲外證自喘石水其脉自沉外證腹滿不喘
黃汗其脉沉遲身軀發熱曾滿四肢面腫久未愈必致癰
膿

腫

腸覃石瘕貳病唯婦人有之
宜服萬安元方在勞莊門中

千金論曰大凡水病難療老後特須慎於口味又病水之

人多嗜食不廉所以此病難愈世有醫者隨逐時情意在財物不本性命病人食肉於貴勝之處勸令食羊頭蹄肉如此者未見一愈者耳又此病百脉之中氣水俱實療之皆令瀉之使虛羊頭蹄極補那得療愈所以治水藥多用葶藶等諸藥本草云葶藶久服令人虛故水病非久虛不得絕其根本又有蠱脹但腹滿不脹而四肢面目但腫醫者不善訴候療蠱以水藥療水以蠱藥或但見脹滿皆以水藥如此者仲景所謂醫殺之今錄慎忌如左

療蠱方在後

喪孝產乳音樂房室譴戲一切魚肉生冷酢滑塩蒜粘米豆油膩並不得食之亦不得用心以上禁者別具本方之下惟房室事猶三年慎之不復再發不慎差而更

發重發不可更療

諸從腰以下腫當利小便腰以上腫當發汗即愈論曰此病多從久患氣急不羸或從消渴或從黃疸或從支飲或從虛損大病羸後失於時治或因產後或因脚氣腫滿或因久患癰疽久經利下或因飲水不即消三焦決漏小便不利變成此疾

川朴消患

凡欲治療當治感疾之由隨證施方以治之十種水氣川朴消煎治十種水氣此方出神仙密經人間无本鄭練師向天台金壇上石壁所記有數本錄得傳療諸疾自行此方二十餘年得効者甚多凡水氣有十種此方俱療之一羸以後永不再發但能斷得鹹物无不効者此是先聖所

傳石壁金壇所記有此靈驗有人先患脚氣十餘年發盛便成水病四時之中偏身腫滿腹硬如石水飲難下靡覺飢渴偃喘鹿不得卧頭不着枕二百餘日無間晝夜即呬粥飲常須倚物而坐羸弱異常因服此藥當日氣散十日後肚硬消盡二十餘日後氣力如舊既獲神驗傳於世

川朴消

杏仁

各壹兩

川芎

烏頭

甜葶藶

紙隔炒赤

葶藶子

水浸芽出炒黃色

椒目

各壹兩

馬牙消

半兩

右葶藶葶藶子杏仁等相和先杵一千杵取大棗十枚煮取肉與前件藥都研令勻然後入煉了蜜和搗一千杵元梧桐子大每服桑白皮湯下二十元空心

補元散 水腫消後補益血氣

人參

白朮

白茯苓

黃耆

蜜炙

苦葶藶

山藥

各壹兩

木香

半兩

附子

壹個

右為細末薑棗煎二錢以水一盞煎至六分去滓不以時溫服

至龍元 治胃熱伏水育腹膨脹

陽起石

白滑石

寒水石

各壹分

硃砂

南鵬砂

各半

輕粉

粉霜

各壹分

右七味都一處先用紙裹了次用麵餅子可半寸厚者裹上更用數重濕帛裹之文武火燒經兩時辰取出上麵紙盡作灰悉去之麵如未焦色再燒半時辰已焦熟

即止地上掘一坑子可五六寸深取藥毬焙之一宿出火毒來日取出剥去焦麵將藥再研如粉飯尖和元如菜豆大飯尖亦須爛研少與藥末用力和揉令勻若飯尖多即藥力少如元以青黛爲衣

服藥法

第一日三元三服

二日四元四服

三日五元五服

四日六元六服

此日夜更用前紫雪丹微動一二行即第五日七元服七服六日八元八服七日十元三服如小便透下住此藥看病大小有只服三四日小便透者至七八日透但以小便透爲度不拘遠近日數也如未甚透快更服此

勾水石韋散

方在後

勝金煎治大腹水氣背刺喘急息不能通

牛黃

昆布

海藻

各二兩半

牽牛

二兩

桂

壹兩冷者加作貳兩

甜葶藶

二兩

椒目

壹兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服二十粒食前米飲下日三漸加至四五十粒日三四以水利為効尋常些小發動覺氣促疾盛夜卧不安數服見効

萬病散十種水病

牽牛子

桑白皮

白朮

黃耆

丁香

陳橘皮

破故紙

各等分

右為細末先煎生薑湯一盞半先喫半盞用半盞調藥

一大錢七服藥後更喫半盞

海藻元 治諸水病者不可填取令便下其水盡其後再發必便困敗三分利之一分立便斷鹽薑諸酸膩滑淡食經旬日後患者氣稍調則更利之如是三度服藥將養以校為度緣先以脾熱克腎號土水相尅也脾土既病下尅於腎水氣不收故成其疾也范汪曰脾胃為表裏胃為水穀府胃虛不化水穀氣海溢而經絡閉故患者大便小便不通寒之氣扇於脾而脹矣主水病坐卧喘急

海藻

昆布

黃牽牛子

各拾兩

葶藶

拾貳兩

椒目

桂

各肆兩

牛黃

貳兩

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服二三十元橘皮

湯下

桂黃元 治水氣腫滿小便不利

硫黃

兩肆

桂

白朮

赤茯苓

澤瀉

豬苓

黃橘皮

各壹兩

右為細末水煮熟和元梧桐子大每服五十元空心橘皮湯下一方無桂以饊餅和元

天一神精丹

消水腫治癰疽氣塊及諸風疾等

丹砂

曾青

雌黃

雄黃

油煎
朱日

磁石

各壹兩

金牙石

陸字
壹字

右將丹砂雌黃二味酸醋浸三日曾青用好酒器中浸紙封日中暴之百日急用七日亦得無以火煖訖各研

如粉以好醋拌勻用好砂量藥多少用合子量大小盛之先以赤石脂固縫外黃土鹽紙中和泥固濟候乾用一鐵三脚子可高五寸其不置火約置合子底以三日火不絕爲度候冷水浸乾泥令透可取打開合子其蓋子上有五色者佳雪白者最上三色者下研令細乾棗肉和元如粟米大每服一元二元如口噤者以鹽梅水洗口牙關自開灌藥下即省曾青如蚯蚓泥如黃連者佳世少此者好崑崙碌亦得以王相日天晴明齋戒沐浴令之若躰無痛處四肢不收神智不乱一臂不隨時能言者可治不能言者不可治謂之風癱宜天麻散西州續命湯如服續命湯而多汗則以金牙酒代之

艾麴散治痢後虛腫水腫者服此藥小便利止腫消散

艾麴壹升

乾薑

細辛

椒目

附子

桂各壹兩

右為細末每服二三錢溫酒調下產後虛腫者大食忌
豬肉生葱生菜

葶藶煎治食水腹堅漸大四肢腫滿

甜葶藶貳兩

川芒硝壹兩

椒目貳兩

水銀壹兩以葶藶內少許研尽

防已

海蛤各壹兩

右為細末蜜元梧桐子大每服三十元米飲下
不以時候

海蛤丹治水氣

海蛤

膩粉

青滑石

寒水石

玄精石

白丁香

各壹分

右滴水和為一塊子以濕帑三重裹用白麵包作一毬子用漚灰火燒半日毬響為度滴水 and 元梧桐子大第一日三元第二日三服六元至七日七元方不加元數黑飴龍腦水下忌塩魚濕麵等物

白元子

治十種水氣

輕粉

粉霜

各壹分

玄精石

壹分半

滑石

半兩

硃砂

半

白直丁香

貳拾个

右先次將粉霜玄精硃砂勻研滴水為元用白麵裹草火內燒麵熟為度不用裹藥麵復同餘藥元如菜豆大

再用滑石爲衣第一日服三元三服二日五元第三日
八元日八服不動臟腑其水隨小便出其効如神熟水
葫蘆散治遍身水腫

木通

葫蘆子

各壹兩半

澤瀉

叁分

防已

貳分

猪苓

海蛤

各壹兩

右爲細末每服五錢水七分酒七分入葱白五寸煎至
八分去滓食前溫進當下小便數升腫消

天雄元若皮膚殼殼然堅腹大身盡腫皮厚按之沒指陷
而不起腹色不変大小便如故此熱客於皮膚之間寒則
氣收聚而不行因而經絡壅遏結於皮膚之間謂之膚脹
治之當瀉氣而散寒

天雄

兩半

甘遂

壹分

黑牽牛

酒浸壹宿炙令熱先去酒炒乾搗麵壹分

枳實

去穰炒

黃橘皮

各半兩

連皮大腹

壹兩酒浸壹宿炒

右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大薑湯下食後每服

三五元

集驗赤豆湯

療虛熱及服石熱當風露卧冷濕傷飢熱阻

在裏變成熱風水病心腹腫滿氣急不得下小便不利大便難四肢腫如皮囊盛水晃々如老蚕色陰卵堅腫如升脰腫生瘡臭如死鼠此皆虛損腎中有熱強取風冷溫痺故也內宜依方服諸利水藥外宜以此湯洗四肢訖以葱豆膏傅之別以猪蹄湯洗瘡爛處及卵腫也

赤小豆

葱

葵藿子

菰菜子

葫蘆根

升伍

巴豆

壹百个

右六味以水一石二斗煮取四斗以淋洗身腫處古今

錄驗同

朱砂水銀煎治水氣

朱砂

水銀

巴豆

粉霜

各壹分

大赭石

兩半

蔓慈

兩半

右爲細末饅餅和元如彈子大每患者安臍中以軟紙

一張摺蓋之後用裹肚

繫定

令病人卧只一兩食飯間其

疾自小便出水約二三斗便佳取出藥恐過度却用生

薑汁調黃連末半兩作一枚安臍中依前用紙蓋裹肚

繫定煎桑白皮湯煮大麥麵餹飪喫之羌後三日用藥

補之如後

海蛤

破故紙

白甘遂

木香

右等分爲細末每服半升米飲調下空心忌醃藏生冷
鹽等物及醋

石韋散 利小便

石韋

半兩去却上黃毛
去不盡即損肺

木通

瞿麥

各半兩

桂府滑石

兩

甘草

半兩

右五味爲細末每服四錢水半升燈心一束同煎至一
半去滓徐徐呷之立効如水透快一晝夜可下數斗便
覺身軀輕快行步如常但極清瘦皮骨相着蓋膜間病
氣去盡故也然牙齦微動紅腫牙齒間腥臭涎粘出三

兩自雖多莫訝便是此藥搜撓中腠間病根一時俱出也候三兩日出得有次第以綿塞子裹治牙藥塞之則已更用青黛棗穰固濟甚佳蓋水本腎病須當治腎方得病退畢竟無妨恐不知有此應驗故先序述水退後須服此續命丹閉水門方在前

猪蹄洗湯

療丈夫服石有虛熱因勞損熱盛當風卧傷於風濕身變成熱風水腫病滿氣急四肢欲腫小便不利陰卵堅腫莖腫生瘡赤爛臭如死鼠名水疸以湯洗之

猪蹄

壹隻

黃蘗

伍兩

葫藿根

貳升

葶藶子

伍合

茯苓子

壹升

右五味以水三斗煮取二斗令洗之日三次

木香元消滯積行水

木香

檳榔

陳橘皮

商陸

木通

右爲細末水煮麵糊和元梧桐子大每服米飲下二十元不以時

論曰病腫者皮膚緊急腫滿無文沒指若目下微腫如卧蚕之狀及足脛皆腫小便不利其人喘急脉沉大而疾此由脾腎虛弱腎虛水不能棄氣揚溢脾胃虛則不能制水水氣流散於經絡經絡水病故能腫滿謂之正水宜正陽丹疏朱丹方見腹脹門脉沉細而弱大便滑皆治大便秘者亦治

正陽丹

宣州木瓜

壹斤去皮核子切碎以童子小便好酒各壹升煮令爛攪取汁

大豆

壹升

附子

半兩

人參

壹兩

銀朱

壹錢

右將三味為細末與銀朱一處研勻將木瓜汁和元梧桐子大煎椒人木香湯下三十元

防已湯

治腹滿按之沒指隨手而起餘與正水皆同但四

肢聶聶動其脉亦浮此由肺氣久虛為風邪所客氣不得運百脉閉塞水氣上行謂之皮水亦宜發汗次以大豆湯

方左后

防已

黃耆

桂

各參兩

茯苓

陸兩

甘草

黃芩

右為鹿末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服非時

碧霞丹

治十種水氣

寒水石

滑石

膩粉

各半

粉霜

硃砂

各參

右同研勻滴水為膏用濕帛一張裹在內麪一斤和作
毬盛藥於牛糞熟火內燒麪勻翻焦熟為度取藥出用
青黛半兩同研滴水元和如豌豆大第一日服三粒日
三次服嚼龍腦或生薑燈心木通湯下

初和甫治水腫等方

經云平治權衡謂察脉浮沉也去遠陳莖謂滌腸胃中腐

敗也開鬼門謂發汗也潔淨府利小便也脉浮如秤衡之
在上即發汗鬼門汗空也脉沉如秤槌之在下即利小便
淨府小腸也又腰以上腫宜發汗腰以下腫利小便千金
外臺並有正方不過麻黃防已白朮猪苓五苓脂之類世
醫不知此悉用棗粉水銀之類攻之百無一生齒脫口糜
氣耗而死余元豐中親見貴人被害忍復言邪

神助散 仁宗賜名治十水之病四肢面目俱腫喘急不得
卧小便澀腹中氣滿

葶藶

兩

黑牽牛

兩

木猪苓

水浸軟切去黑皮焙

澤瀉

各壹兩

椒目

壹兩

右爲細末先以葱白三莖漿水一盞煎至半盞入酒半

盞調藥三錢絕早面東服如人行十里以漿水荅白煮
稀粥至蕊爛入酒五合熱啜量人啜一升來不得喫鹽
并麵自平旦服至日午當利小便三四升或大便喘定
腫減七八隔日再服既平之後必須大將息及斷房室
等三年孫兆父子常進

黃龍散

如服青龍丹後至第五日水道澁滯不快即服之

如通快不須服

木通

瞿麥

各壹兩

大黃

半兩

陳橘皮

壹分

檳榔

肆個

右為細末每服二錢或三錢隨澁甚不甚加減用湯使
三盞用煎至八分和滓熱服今具湯使如後通草燈心

各一分小麥一合水三升煎取汁一半去滓用煎藥自
初每日喫三服每服下青龍丹三元喫至七日每日加
一元都共一百二十六元

茯苓湯治皮水其脉亦浮外證肘腫按之沒指亦不惡風
其腹如鼓不渴當發其汗渴而不惡寒者此為皮水身腫
而疼狀如風痺皮水為病四肢腫水在皮膚中聶聶動防
已茯苓湯主之

防已

黃耆

桂

各參兩

茯苓

陸兩

甘草

貳兩

右為細末水一盞煎藥三錢至六分去滓溫熱服非時
白朮散若其人久下利之後卒然身躄足脛面目浮腫小

便反快切其脉大而虛此由脾肺虛弱肺虛則不能潮諸氣脾虛則肌肉空踈氣無所歸

黃橘皮

大腹皮

茯苓皮

生薑

各半兩

白朮

壹兩

右爲細末米飲調下三錢不以時

若不因他病面目卒然如水身無痛形不瘦不能食切其脉大緊此由風寒之氣客於腎經其脉從腎上貫膈入肺中故上乘肺而氣不下流風與氣搏故面目浮腫久不治之腎傳於心令人善驚暴痿而死

澤瀉湯

澤瀉

天雄

白茯苓

半兩

防風

壹兩

枳實

兩半

右為細末每服五錢水二盞薑三片煎至一盞去滓溫

服食前

小黃耆散

黃耆

赤小豆

各壹兩

土茯苓

枳實

各半兩

防風

壹兩

右為細末米飲調下二錢或溫酒亦可

小白朮散

白朮

甘草

各壹兩

白茯苓

半兩

桑白皮

叁分

右為細末每覺渴時點一錢服之無時服數水消後尋

常可服此補益散

方在後

補益散

陳橘皮

大腹皮

茴香

各壹兩

桂

半兩

右為細末每服一錢溫米飲調下日進三服

已上八方須依次第服食病除後忌生冷鹹酸酒麪油膩雞猪葷發風物只喫淡粥飯或石子鶴子候積漸得食力可食煮軟羊肉宿饊餅不妨其他一切不可食蓋水候自是亂思飲食徃徃緣此發動大可為戒房事尤不可道養本法三年戒忌縱不能亦須一年戒忌又此病大忌灸針飲酒毒物

青龍丹

治水氣蔣提倉患水氣其勢甚危他藥無効因張芝叟傳此取水數斗遂尔如舊有餘藥以贈一杜道人亦

患水氣亦一服而効

青黛

鵬砂各壹

白丁香

輕粉各貳

右同研勻滴水作塊子用蒸餅劑裹一重桑柴灰內煨候熟再裹一重又煨熟放冷剝去麵用水煮麵糊和元梧桐子大茴香湯下前件藥先契勘七日內合喫的確元數依樣大小服之自第一日至七日水未盡中間不可斷續服也第四日第五日其畜水隨小便出約一二斗候肚皮塌是効如有餘證即服向後準備藥第一日三粒二日四粒三日五粒四日七粒五日六粒九粒並茴香湯下日三服

越婢加朮湯治腰上浮腫骨節疼痛其人惡風面目悉腫

小便不利此由風濕客搏脾經脾受濕則腫風又剋脾脾氣不流行氣聚為水以風行於上故但腰已上腫其脉浮太當發汗風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風身躰不疼但重而酸其人不渴汗出即愈此為風水惡寒也此為極虛發汗得之夫風水脉浮為表其人或頭汗出表無他病病者但下重故知從腰以上為和腰以下當腫及陰難以屈伸防已黃耆湯主之腹痛者加芍藥風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出而無大熱者

麻黃

兩伍

石膏

斤半

甘草

兩貳

白朮

肆兩

右為鹿末每服五錢水二盞生薑三片棗一箇煎至一盞去滓溫服惡風加炮附子半兩

水病之初先目上腫起如老蚕色狀頭脉動股裏冷脛中滿按之沒指腹內轉側即有聲此其候也不即治湏臾身軀稍腫肚盡脹按之隨手起則病已成猶可為治此是從虛損大病或下痢後或從支飲或從消渴或從崩漏或從氣或從黃疸或從瘡癰婦人產後飲之水不即消三焦決病小便利乃相結漸漸生聚遂流諸經絡故也

葶藶子元治身面浮腫及治腫入腹苦滿急害飲食方

葶藶子

葶藶子

椒目

茯苓

各參

吳茱萸

兩

右為細末煉蜜和元梧桐子大每服米飲下十元日三服此滿或是虛氣或是風冷或是水飲氣此方皆治之

樟柳散消諸般水腫

白樟柳片壹

陳皮貳兩

木香兩壹

赤小豆麵肆兩

右為細末入水杵為元如棗豆大每服二十元橘皮湯下或為散作鯉魚羹如料入用

黃者五兩湯治黃汗其脉沉遲身熱發熱胃滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿胃中窒塞不能下食結聚疼痛暴躁不眠此為黃汗黃汗之病兩脰自冷假令發熱此屬歷節食已汗出身常暴躁盜汗出者此勞氣也若汗出已晚反發執著久久其身必腫發熱不止者必生惡瘡若身重汗出已輒身輕者久久必身潤潤即胃中痛及從腰上汗出下無汗腰臑弛痛如有物在皮中狀劇者不能食身疼重煩躁小便不利此為黃汗

黃耆

伍斤

白芍藥

桂

各參斤

甘草

參斤

右爲細末每服三錢水一盞生薑七片棗一枚同煎至七分去滓食後溫服

黃耆桂枝苦酒湯

黃汗之爲病身腫發熱汗出而渴狀

如風水汗沾衣色正黃如蘗汁脉自沉此得之出入水中浴水從汗孔子入爲黃汁

黃耆

伍斤

白芍藥

桂

各參斤

右爲細末每服三錢水九分醋一分相和煎之去滓溫服當心煩也至六七日乃解若煩不止者以苦酒阻故

也

一方以清美醞代苦酒

庚戌八月十二日夜夢爲費無虞縣封治水氣藥方

每牽牛三粒對胡椒一粒每胡椒十粒對木香皂子
大蠋稍一箇

右爲細末水煮麵糊和元如麻子大每服十元臨卧橘
皮湯下令與赤小豆煮附子藥同服乃効於次年八月
中費無虞縣封果患水疾令服此方遂愈

神掌膏治十種水氣

巴豆

膩粉各半兩

硫黃龍眼大一壺塊子

右研勻滴水成膏作餅子用綿裹數重貼患處臍中以
帶子勒之初更用藥至中夜覺身似火熱水從小便下
候四更腫消去藥然後喫調氣藥補元散方在前

蛇黃餅子謹藥王治水方

白丁香

左列

蟬黃

南鵬砂

各等分用炒合子盛

右紙泥固濟用桑木火燒合子通赤取出放冷研細入少白麵滴水作餅子空心嚼細熟水下日三服第二日兩餅三日三餅第四日四餅第五日五餅第六日六餅第七日七餅第八日八餅如水行即止如不及八日但水行住服如牙縫內有血雖水出亦死日進三服其餅子只如雞頭大可矣

大棗杏仁元

崔氏療大腹水病身躰腫上氣小便澁赤臍

深頸上有兩大脉動唾稠不得眠睡每腫先從腳腫亦有在前頭面腫大便澁者服此藥大佳若先患大便利臍凸腹大脹手掌平滿即不可服此藥

大棗

肆拾个肥大不蛀者先以煖水浸令軟以次飯裏蒸了剥去皮核

葶藶

伍兩取苦者燉令紫色

杏仁

叁兩不取合歡者以湯去皮燉令黃去尖

右三味先搗葶藶子一万下寫出之乃搗杏仁三百下訖搗和合棗膏搗一万下藥成平旦空腹服之八元日晚食消更服五元以飯汁下之三日後每旦服五元晚服三元如棗核大如大便利未得服此藥若正服藥次忽患痢即先食二三口飯然後喫藥若利過多停藥即可爛煮小豆勿以鹽食之忌鹹脂膩及太冷物等惟得食秬粟米飯及淡醋不得喫稀粥唯只得喫飯佳如食粥即稠煮粥不便遣大便利出

陷水散

治十種水氣極甚腫從脚起入腹證候難忍宜服

此方

大戟

兩半

當歸

陳皮

各壹兩

右爲細末每服五錢水一大盞煎至五分去滓臨臥腹空時溫服

逐水散消腫滿

生薑陸

赤豆

各叁兩

鯽魚

叁個

右三味實魚腹中以麻線縛之水三升煮赤豆爛去魚只取二物空腹中食之以魚汁送下不汗利即差甚者過二日再作之不過三劑貴戚家乳姥病水飲之一劑即愈

大豆散消滯氣去濕

大豆

生升炒
焦去皮

白朮

兩

右為細末米飲調下二錢不以時

桑皮豆法

療暴水風水腫或瘡中水通身皆腫

乾香薷

白朮

兩

右二味搗末為末濃煮香薷取汁和末為劑元梧桐子
大每服十元日夜四五服利小便極良夏取花葉合用
亦佳忌桃李雀肉青魚鯽等

桑皮豆法

治水腫小便不利疾輕者

赤小豆

升

桑白皮

兩

右以水同煮至軟爛去白皮只如常服喫赤小豆末已
再服无妨和汁飲之尤妙

萬金散治丈夫婦人十種水氣

川獨活

不以多少汶上名醫西董及之
去羗活壹本而大者是也

右爲細末每服二錢精肉四兩批大片洗過入藥在內
麻線繫定銀石器內河水煮令熟令患人喫盡小腸取
下泔糊之狀老人五七日再服少壯三兩日病愈止

石英酒治石水

白石英

拾兩

右碎如大豆盛埒餅中用好酒一斗三升浸如泥封口
以馬糞糠秕火燒之從卯至午後長令酒小沸火盡即
便添燒畢於平處安置日三度飲之如不飲酒亦據器
量少飲之餘石英以酒更一度燒煮依前服

商陸逐水散 治水氣

白商陸根

去麁皮薄切陰乾或焙乾爲末

右用黃顙魚三個大蒜三瓣菴豆一合水一升同煮以豆爛爲度先食豆飲汁送下又以汁下藥二錢水化爲氣內消

省郎王申病水氣四肘悉病不能坐卧晝夜倚壁而立服此一劑頓愈新熱食竟入水自潰及

浴者令人太腹爲水病

大豆煎

治女人久新腫得惡暴風入腹婦人新產上溷清

風入臍腹中如鞭者噓吸短氣咳嗽

大豆一升

右以水五斗煮之得一斗三升澄清去下濁者內釜中以二斗半美酒內汁中煎取九升宿勿食旦服三升溫

覆取汗兩食頃廼下去風氣腫慎風冷十日平復如故
治水氣連四肢腫者謂之水氣若止腹腫是蠱毒非水氣
用蓬蒿草出秦隴及西蕃如小樹狀本土人識之熬乾
取鹿皮去枝幹搗細末空心溫米飲調下半錢匕水即
大泄大小便皆出獲安然後服溫和脾胃藥如理中圓
節喜怒生冷鹹硬濕麵米粥之類忌鹽物不可向口禁
絕慾大効此方本得於西天蕃僧本草不載中國无方

治石水方

十水葶藶散
等脈沉緊數

代州錢防禦命孫兆訖脈得沉緊數六至已上外證目下
腫鼻準亦腫唇色紫自心已下腹大腫脹外陰器腫脹如
升按之如石堅舉動即喘欬逆痰涎口苦乾渴去得病已

及兩月醫者皆去下虛風氣近曾臍下着灸三里亦灸之
兆告曰病名石水治不主對故不愈仲景曰腰下及腹腫
者皆利其小便又曰腹滿口苦乾燥此腹中有水也方以
防已葶藶椒目大黃元主之遂與服三元日三少覺胃腹
快遂與聖惠方治十水葶藶散初服三錢以葱漿水酒下
食頃以葱漿稀粥投之隔日一服每服葶藶散之日至日
中暮更服防已椒目葶藶大煎元三服次日但進元子三
服凡十日覺大便秘利腫脹喘咳已減三之一二十日病
去三之二自此消息加減三十日而全愈

治風水法

有兒十五歲病身腫浮數大便秘自利米穀不化此成風

水病以越婢加朮湯主之五苓散亦可兼服然正治風水不及此

消飲白朮煎

治支飲上氣不得卧身躰腫滿小便不利

陳橘皮

壹兩

澤瀉

白朮

茯苓

各半兩

甘草

防己

葶藶

木香

各壹分

右爲細末水煮麵糊和元梧桐子大薑湯下三十元不以時

三稜元

治膀胱氣兩脇疼痛遍身虛腫狀如水氣常服治

大小腸氣女人血氣

荊三稜

茴香

白附子

破故紙

甘遂

芫花

檳榔

黃橘皮

當歸

川練子

桂

木香

川椒

各半兩

右為細末酒煮麵糊和元梧桐子大每服七元至十元食後白米湯下

水銀丹

治水氣

水銀

牙硝

椒目

苦葶藶

各壹兩

右為細末煉蜜和杵五七百下元梧桐子空心服二十元或臨卧其病當從大小便俱利可喫法煮赤小豆以東引桑枝灰淋汁煮豆令熟每日空心喫一盞如渴即飲

白朮湯

白朮

甘草 各肆分

桑白皮 各叁分

茯苓 貳分

右如茶點切不可飲冷

膩粉滑石元 治水氣

膩粉

滑石

海蛤

大麥蘖 各貳分

粉霜

硃砂 各壹錢

斑猫

肆拾玖个已上末之以石腦油和團麴果燒熟再入

白丁香

白鷹鷂調

鸛鵲糞

鷺子糞 各貳分

右研勻與前藥再用石腦油和元梧桐子大瞿麥湯下

一元

漢防已散 治虛勞四肢浮腫喘息促急小便不利坐卧不安

漢防已

猪苓 各叁分

白朮

陳橘皮 各壹兩

木香

白朮

各半兩

桑根白皮

赤茯苓

各一分

檳榔

紫蘇莖葉

木通

各壹兩

右爲麤末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

京三稜元

治丈夫婦人頭面手足腫

青皮黃皮各一兩湯浸一宿次日淘赤小豆一合袞煮二橘皮候豆六七分熟去青皮研黃皮赤小豆如泥若乾旋添煮豆汁再研極細用後藥

赤茯苓

壹兩半

猪苓

吳白朮

蓬莪茂

各半兩

半夏

叁分

京三稜

捌錢

防已

枳實

叁分

右爲細末煉密和同小豆泥入臼杵成膏元梧桐子大
每服三十元熟水下不以時

五皮散 治頭目四肢悉腫

大腹皮

桑白皮

茯苓皮

生薑皮

陳橘皮

右等分爲細末每服三錢水一盞半煎至一盞去滓取
七分熱服日二三